

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ  
ETAPA LOCALĂ – 25 IANUARIE 2014

## Clasa a XII-a

**Problema 1** a) Fie  $(G, \cdot)$  un grup și  $e$  elementul său neutru. Elementele  $a, b \in G$  satisfac condiția:  $a^2 = b^2 = (ab)^2$ . Să se arate că  $a^4 = b^4 = e$ .

b) Dacă  $(A, +, \cdot)$  este un inel necomutativ și  $a, b \in A$  au proprietate  $a^2 + b^2 = ab$ , atunci să se demonstreze că  $(ab)^2 = b^2a^2$  și  $(ba)^2 = a^2b^2$ .

*((A, +, \cdot) este un inel necomutativ dacă pe mulțimea A sunt definite legile de compoziție „+” și „\cdot” cu proprietățile: (A, +) este grup comutativ, (A, \cdot) este monoid necomutativ și  $a(b+c) = ab+ac$ ,  $(b+c)a = ba+ca$ ;  $\forall a, b, c \in A$ .)*

**Problema 2.** Fie  $p$  un număr prim de forma  $4k+3$ ,  $k \in \mathbb{N}$ .

- Să se arate că nu există  $x \in \mathbb{Z}_p$  astfel încât  $x^2 + \hat{1} = \hat{0}$  (în  $\mathbb{Z}_p$ ).
- Să se arate că dacă  $x^2 + y^2 = \hat{0}$ ,  $x, y \in \mathbb{Z}_p$ , atunci  $x = \hat{0}$  și  $y = \hat{0}$ .
- Să se rezolve în  $\mathbb{Z}$  ecuația  $x^2 + y^2 = 12005$ .

**Problema 3.** Dacă  $x \in (0, \infty)$  calculați:

- $\int \frac{1}{x(x^{2014} + 1)} dx$ ;
- $\int \frac{1}{1 + \sqrt{x} + \sqrt{x+1}} dx$ .

**Problema 4.** Fie  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție care admite primitive. Să se arate că funcția  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(x) = |x|f(x)$  admite primitive.

Gazeta matematică

**SUCCESS!**

**Baremul de notare este:** Problema 1. a) 4 puncte; b) 3 puncte; Problema 2. a) 2 puncte; b) 2 puncte; c) 3 puncte; Problema 3. a) 3 puncte; b) 4 puncte; Problema 4. 7 puncte.

## ENUNȚURI ȘI SOLUȚII

### CLASA a IX-A

**P1. IX.** Dacă  $a, b, c \in \mathbb{R}$  arătați că:

a)  $(a+1)^2 + b^2 + (c-1)^2 = (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ca+c-a-1)$ ;

b)  $(a+1)b + (c-1)b + (a+1)(c-1) \leq (a+1)^2 + b^2 + (c-1)^2$ ;

c)  $ab+bc+ca + \max\{|a-b|, |b-c|, |c-a|\} \leq 1 + \frac{1}{3}(a+b+c)^2$ .

Demonstrație: Putem presupune  $a \leq b \leq c \Rightarrow \max\{|a-b|, |b-c|, |c-a|\} = c-a$

$$ab+bc+ca - a + c - 1 = (a+1)b + (c-1)b + (a+1)(c-1) \leq (a+1)^2 + b^2 + (c-1)^2 =$$

$$(a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ca+c-a-1) \Rightarrow ab+bc+ca + \max\{|a-b|, |b-c|, |c-a|\} \leq 1 + \frac{1}{3}(a+b+c)^2.$$

**P2. IX.** Fie  $x, y \in \mathbb{R}^*$ , astfel încât  $x+y \neq 0$  și  $(a_n)_{n \geq 1}, (b_n)_{n \geq 1}$  două șiruri de numere reale. Arătați că:

a) Dacă  $(a_n)_{n \geq 1}$  și  $(b_n)_{n \geq 1}$  sunt progresii aritmetice atunci șirul  $(c_n)_{n \geq 1}$ , definit prin  $c_n = a_n b_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$ , este progresie aritmetică dacă și numai dacă una din progresiile aritmetice  $(a_n)_{n \geq 1}$  sau  $(b_n)_{n \geq 1}$  are rația egală cu 0.

b) Dacă  $(1+xa_{n+1})(1+ya_n) = 1, (x+y)(a_n b_n - 1) = xy a_n$  și  $(x+y)b_n - xy \neq 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$  atunci șirul  $(b_n)_{n \geq 1}$  este progresie geometrică.

Demonstrație: a)  $(x_n)_{n \geq 1}$  este progresie aritmetică  $\Leftrightarrow 2c_n = c_{n-1} + c_{n+1} \Leftrightarrow 2a_n b_n = (a_n - x)(b_n - y) + (a_n + x)(b_n + y) \Leftrightarrow xy = 0$

b)  $(x+y)(a_n b_n - 1) = xy a_n \Leftrightarrow a_n = \frac{x+y}{(x+y)b_n - xy} \forall n \in \mathbb{N}^* \Rightarrow (1+xa_{n+1})(1+ya_n) = 1 \Leftrightarrow b_{n+1} = -\frac{x}{y} b_n$

**P3. IX.** Fie șirul de numere reale  $(a_n)_{n \geq 1}$ , definit prin  $a_1 = \frac{1}{6}$  și  $a_{n+1} = \frac{n+1}{n+3} \left( a_n + \frac{1}{2} \right), \forall n \in \mathbb{N}^*$ .

Determinați  $a_{2014}$ .

Demonstrație:

$$n = 1: a_2 = \frac{2}{4} \left( \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{6} = \frac{2}{6}$$

$$n = 2: a_3 = \frac{3}{5} \left( \frac{2}{6} + \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{6} = \frac{3}{6}$$

$$P(n): a_n = \frac{n}{6}$$

$$P(1): a_1 = \frac{1}{6} \quad (A)$$

.....

$$P(n+1): a_{n+1} = \frac{n+1}{6}$$

$$a_{n+1} = \frac{n+1}{n+3} \left( \frac{n}{6} + \frac{1}{2} \right) = \frac{n+1}{n+3} \cdot \frac{n+3}{6} = \frac{n+1}{6}$$

$$\text{Deci } a_{2000} = \frac{2000}{6} = \frac{1000}{3}$$


**P4. IX.** Dacă  $ABC$  este un triunghi oarecare și  $E, F, O, M$  sunt puncte cu proprietățile  $E \in (AB)$ ,  $F \in (AC)$ ,  $O \in (EF)$ ,  $M \in (BC)$ ,  $\overline{BM} = 2\overline{MC}$ ,  $5\overline{AE} = 7\overline{EB}$  și  $12\overline{OM} = 3\overline{AB} + 2\overline{AC}$  demonstrați că  $EF \parallel BC$ .

Demonstrație:  $5\overline{AE} = 7\overline{EB} \Leftrightarrow \overline{AE} = \frac{7}{12}\overline{AB}$ , fie  $x \in (0, \infty)$  astfel încât  $\overline{AF} = x\overline{FC} \Leftrightarrow \overline{AF} = \frac{x}{x+1}\overline{AC}$ ;

$$\overline{EF} = \overline{EA} + \overline{AF} = -\frac{7}{12}\overline{AB} + \frac{x}{x+1}\overline{AC} \quad (1); \quad 12\overline{OM} = 3\overline{AB} + 2\overline{AC} \Leftrightarrow$$

$$\overline{OB} + \overline{OC} = \frac{1}{2}\overline{AB} + \frac{1}{3}\overline{AC} \Leftrightarrow 2\overline{OB} + \overline{BC} = \frac{1}{2}\overline{AB} + \frac{1}{3}\overline{AC} \Leftrightarrow$$

$$\overline{OB} = \frac{3}{4}\overline{AB} - \frac{1}{3}\overline{AC} \quad (2); \quad \overline{EO} = \overline{EB} + \overline{BO} \stackrel{(2)}{=} -\frac{1}{3}\overline{AB} + \frac{1}{3}\overline{AC} \quad (3); \quad \text{vectorii}$$



$$\overline{EF} \text{ și } \overline{EO} \text{ coliniari} \Leftrightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R} \text{ astfel încât } \overline{EF} = \alpha \overline{EO} \stackrel{(1),(3)}{\Leftrightarrow} \alpha = \frac{7}{4} \text{ și } x = \frac{7}{5} \Rightarrow EF \parallel BC.$$

### CLASA a X-A

**P1. X.** a) Arătați că  $\log_a \sqrt{x} + \log_{a^2} \sqrt[3]{x} + \log_{a^3} \sqrt[4]{x} + \dots + \log_{a^n} \sqrt[n+1]{x} = \log_a \sqrt[n+1]{x^n}$ ;  $\forall a, x \in (0, \infty)$ ,  $a \neq 1$ .

Soluție :

$$a) \frac{1}{2} \log_a x + \frac{1}{2 \cdot 3} \log_a x + \dots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} \log_a x \dots \dots \dots 1 \text{ punct}$$

$$\log_a x \cdot \left( \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} \right) = \log_a x \cdot \left( \frac{1}{1} - \frac{1}{n+1} \right) \dots \dots \dots 1 \text{ punct}$$

$$\text{Finalizare} \dots \dots \dots 1 \text{ punct}$$

b) Determinați partea întreagă a numărului  $N = \log_{2013} 2014 + \log_{2014} 2013 + 2013^{\log_{2014} 2015} - 2015^{\log_{2014} 2013}$ .

Soluție :

$$b) 2013^{\log_{2014} 2015} - 2015^{\log_{2014} 2013} = 0 \dots \dots \dots 1 \text{ punct}$$

$$x = \log_{2013} 2014 \in (1, 2) \dots \dots \dots 1 \text{ punct}$$

$$x + \frac{1}{x} \in [2, 3) \dots \dots \dots 1 \text{ punct}$$

$$\text{Finalizare } [N] = 2 \dots \dots \dots 1 \text{ punct}$$

**P2. X.** a) Arătați că, pentru oricare două numere complexe  $z_1, z_2$ , egalitatea  $|z_1| + |z_2| = |z_1 + z_2|$  este adevărată dacă și numai dacă  $\exists \alpha \in (0, \infty)$  astfel încât  $z_1 = \alpha z_2$ .

Soluție :

$$b) \text{ Verificarea implicației } \leftarrow \dots \dots \dots 1 \text{ punct}$$

Implicatia  $\rightarrow$

$$z_k = a_k + b_k \cdot i \text{ si calcul } \dots \dots \dots 1 \text{ punct}$$

$$\text{Obținerea relației } a_1 b_2 = b_1 a_2 \text{ si finalizare } \dots \dots \dots 1 \text{ punct.}$$

$$c) \text{ Determinați mulțimile } A = \{z \in \mathbb{C} \mid |z^2 + 2z + 2| + |z^2 + 2z + 1| = 1\} \text{ și } M = \{\operatorname{Re} z \mid z \in A\}.$$

Soluție :

b)  $|z^2 + 2z + 2| + |z^2 + 2z + 1| = 1 \Leftrightarrow |z^2 + 2z + 2| + |z^2 + 2z + 1| = |z^2 + 2z + 2 + (-z^2 - 2z - 1)| \Leftrightarrow \dots 2$

puncte

$\exists \alpha \in (0, \infty)$  astfel încât  $(\alpha + 1)z^2 + 2(\alpha + 1)z + \alpha + 2 = 0 \Leftrightarrow z = -1 \pm \frac{\sqrt{\alpha + 1}}{\alpha + 1}i \dots 1$  punct

Aflarea elementelor multimilor ..... 1 punct

**P3. X.** a) Arătați că  $\{\sqrt[3]{1 + a^x} + \sqrt[3]{1 - a^x} | x \in \mathbb{R}\} \subset (0, 2)$

Soluție :

a) Verificare  $\sqrt[3]{1 + a^x} + \sqrt[3]{1 - a^x} > 0 \dots 1$  punct

$\sqrt[3]{1 + a^x} + \sqrt[3]{1 - a^x} < 1 + 1 \dots 1$  punct

$\sqrt[3]{1 + a^x} - 1 < 1 - \sqrt[3]{1 - a^x}$  ; amplificare cu conjugata

Finalizare  $\sqrt[3]{1 + a^x} + \sqrt[3]{1 - a^x} < 2 \dots 1$  punct .

b) Dacă  $n, m \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$  arătați că  $\frac{1}{2\sqrt[m]{1}} + \frac{1}{3\sqrt[m]{2}} + \dots + \frac{1}{(n+1)\sqrt[m]{n}} < m$ .

Soluție :

b)  $\frac{1}{(k+1)\sqrt[m]{k}} = \sqrt[m]{k^{m-1}} \cdot \frac{1}{k(k+1)} = \sqrt[m]{k^{m-1}} \cdot \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) \dots 1$  punct

$\sqrt[m]{k^{m-1}} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt[m]{k}} - \frac{1}{\sqrt[m]{k+1}}\right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt[m]{k^{m-1}}} + \dots + \frac{1}{\sqrt[m]{(k+1)^{m-1}}}\right) = \left(\frac{1}{\sqrt[m]{k}} - \frac{1}{\sqrt[m]{k+1}}\right) \cdot \left(1 + \dots + \sqrt[m]{\left(\frac{k}{k+1}\right)^{m-1}}\right) <$

$< \left(\frac{1}{\sqrt[m]{k}} - \frac{1}{\sqrt[m]{k+1}}\right) \cdot m \dots 2$  puncte

Inlocuire si finalizare ..... 1 punct

**P4. X.** Fie numerele complexe distincte  $a, b, c$  astfel încât  $(a+b)^3 = (b+c)^3 = (c+a)^3$ . Să se arate că

$a^3 = b^3 = c^3$ .

Soluție :

Din relatia din enunt si tinand cont de faptul ca a, b, c sunt distincte , rezulta ca a+b , b+c , c+a sunt distincte si nenule ..... 1 punct

Atunci  $\left(\frac{a+b}{b+c}\right)^3 = \left(\frac{a+b}{c+a}\right)^3 = 1$  , de unde  $a + b = \varepsilon(b + c) = \varepsilon^2(c + a)$  , unde  $\varepsilon \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$  si  $\varepsilon^3 = 1$

..... 3 puncte

Adunand membru cu membru relatiile  $a + b = \varepsilon(b + c)$  ,  $b + c = \varepsilon(c + a)$  ,  $c + a = \varepsilon(a + b)$

Se obtine  $a + b + c = 0 \dots 1$  punct

Finalizare ..... 2 puncte

### CLASA a XII-A

**P1. XII.** a) Fie  $(G, \cdot)$  un grup și  $e$  elementul său neutru. Elementele  $a, b \in G$  satisfac condiția:

$a^2 = b^2 = (ab)^2$ . Să se arate că  $a^4 = b^4 = e$ .

b) Pe mulțimea  $A$  se definesc legile de compoziție „+” și „ $\cdot$ ” cu proprietățile:  $(A,+)$  este grup comutativ,  $(A,\cdot)$  este monoid necomutativ și  $a(b+c)=ab+ac$ ,  $(b+c)a=ba+ca$ ,  $a^2+b^2=ab$ ;  $a, b, c \in A$ . Să se arate că  $(ab)^2 = b^2a^2$  și  $(ba)^2 = a^2b^2$ .

Demonstrație: a)

$$a^2 = (ab)^2 \Leftrightarrow a^2 = abab \Rightarrow a = bab$$

$$b^2 = (ab)^2 \Rightarrow b^2 = abab \Rightarrow b = aba$$

$$\text{Atunci } ab = (bab) \cdot (aba) \Leftrightarrow ab = b(aba)ba \Leftrightarrow ab = b^3a$$

$$\text{Înmulțind la dreapta cu } a \text{ obținem } aba = b^3a^2 \Leftrightarrow b = b^3a^2 \Rightarrow b^2a^2 = e$$

$$\text{Cum } a^2 = b^2, \text{ ultima egalitate se scrie } a^4 = e \Leftrightarrow b^4 = e$$

b)

$$\text{Din } a^2 + b^2 = ab \Rightarrow a^3 + ab^2 = a^2b \text{ și } a^4 + b^3 = ab^2$$

de unde, prin adunare, se obține  $a^3 + b^3 = 0$

$$\text{Tot } a^2 + b^2 = ab \Rightarrow a^4 + a^2b^2 = a^3b \text{ și } a^2b^2 = -a^4 - b^4 \quad (1)$$

$$a^2 + b^2 = ab \Rightarrow b(a^2 + b^2)a = baba \Rightarrow ba^3 + ab^3 = (ba)^2 \quad (2)$$

$$a^3 + b^3 = 0 \Rightarrow ba^3 + ab^3 = -b^4 - a^4 \quad (3)$$

$$\text{Din (1), (2) și (3) } \Rightarrow (ba)^2 = a^2b^2$$

Pe de altă parte,  $(ab)^2 = (a^2 + b^2)^2 = a^4 + b^4 + a^2b^2 + b^2a^2$  și (1) implică

$$(ab)^2 = b^2a^2$$

**P2. XII.** Fie  $p$  un număr prim de forma  $4k+3$ ,  $k \in \mathbb{N}$ .

a) Să se arate că nu există  $x \in \mathbb{Z}_p$  astfel încât  $x^2 + \hat{1} = \hat{0}$  (în  $\mathbb{Z}_p$ ).

b) Să se arate că dacă  $x^2 + y^2 = \hat{0}$ ,  $x, y \in \mathbb{Z}_p$ , atunci  $x = \hat{0}$  și  $y = \hat{0}$ .

c) Să se rezolve în  $\mathbb{Z}$  ecuația  $x^2 + y^2 = 12005$ .

Demonstrație:

a). Aplicăm Mica teoremă a lui Fermat: dacă

$$(x, p) = 1, x \in \mathbb{Z} \Rightarrow p \mid x^{p-1} - 1 \Rightarrow p \mid x^{4k+2} - 1.$$

Presupunem că există  $x \in \mathbb{Z}_p$  astfel încât

$$x^2 + \hat{1} = \hat{0} \Leftrightarrow x^2 = -\hat{1} \Rightarrow x^{2(2k+1)} = (-\hat{1})^{2k+1} \Rightarrow \hat{1} = -\hat{1}(\text{fals}).$$

b). Presupunem că  $(\exists)x, y \in \mathbb{Z}_p^*$  astfel

încât  $x^2 + y^2 = \hat{0} \Leftrightarrow (xy^{-1})^2 + \hat{1} = \hat{0}(\text{fals})$ . În concluzie singura soluție este

$$x = y = \hat{0}.$$

c). Ecuația se mai scrie  $x^2 + y^2 = 2401 \cdot 5 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 7^4 \cdot 5$ . Reducând

ecuația în  $\mathbb{Z}_7 \Rightarrow x^2 + y^2 = \hat{0}, x, y \in \mathbb{Z}_7 \Rightarrow x = y = \hat{0}$ .

Deci  $x = 7 \cdot a, y = 7 \cdot b, a, b \in \mathbb{Z}$ .

Ecuația devine

$$a^2 + b^2 = 49 \cdot 5;$$

La fel  $a = 7m, b = 7n \Rightarrow m^2 + n^2 = 5 \Leftrightarrow$

$$(m, n) \in \{(2, 1), (2, -1), (-2, 1), (-2, -1), (1, 2), (-1, 2), (1, -2), (-1, -2)\} \Rightarrow$$

$$(x, y) \in \{(98, 49), (98, -49), (-98, 49), (-98, -49)\} \cup$$

$$\{(49, 98), (-49, 98), (49, -98), (-49, -98)\}.$$

**P3. XII.** Dacă  $x \in (0, \infty)$  calculați:

a)  $\int \frac{1}{x(x^{2014} + 1)} dx;$

b)  $\int \frac{1}{1 + \sqrt{x} + \sqrt{x+1}} dx.$

Demonstrație: a)  $\frac{1}{x(x^{2014} + 1)} = \frac{1}{x} - \frac{x^{2013}}{x^{2014} + 1} \Rightarrow \int \frac{1}{x(x^{2014} + 1)} dx = \ln x - \frac{1}{2014} \ln(x^{2014} + 1) + c, c \in \mathbb{R}$

b)  $\int \frac{1}{1 + \sqrt{x} + \sqrt{x+1}} dx = \int \frac{1 + \sqrt{x} - \sqrt{x+1}}{2\sqrt{x}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx + \frac{1}{2} \int 1 dx - \frac{1}{2} \int \frac{x+1}{\sqrt{x^2+x}} dx$

**P4. XII.** Fie  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție care admite primitive. Să se arate că funcția

$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = |x|f(x)$  admite primitive.

$$g(x) = \begin{cases} x \cdot f(x), & x \geq 0 \\ -x \cdot f(x), & x < 0 \end{cases}; f \text{ admite primitive} \Rightarrow \exists F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \text{ derivabilă, cu } F' = f$$

$$x \cdot f(x) = [x \cdot F(x)]' - F(x)$$

$F$  derivabilă  $\Rightarrow F$  continuă  $\Rightarrow F$  admite primitive. Fie  $H : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , derivabilă, cu  $H' = F$

$$x \cdot f(x) = [x \cdot F(x)]' - H'(x) = [x \cdot F(x) - H(x)]'; \quad -x \cdot f(x) = [-x \cdot F(x) + H(x)]'$$

Definim funcția  $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, G(x) = \begin{cases} xF(x) - H(x) + c, & x \geq 0 \\ -xF(x) + H(x) + c', & x < 0 \end{cases}$ .  $F, H$  sunt derivabile pe  $\mathbb{R} \Rightarrow G$

derivabilă pe  $\mathbb{R}^*$  și  $G' = g$  pe  $\mathbb{R}^*$

$$G \text{ continuă în } x_0 = 0 \Rightarrow c' = c - 2H(0) \Rightarrow G(x) = \begin{cases} xF(x) - H(x) + c, & x \geq 0 \\ -xF(x) + H(x) + c - 2H(0), & x < 0 \end{cases}$$

$$G'_d(0) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x F(x) - H(x) + c + H(0) - c}{x - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (F(x) - \frac{H(x) - H(0)}{x}) = F(0) - H'(0) = F(0) - F(0) = 0$$

$$G'_z(0) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{-x F(x) + H(x) + c - 2H(0) + H(0) - c}{x - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} (-F(x) + \frac{H(x) - H(0)}{x}) = -F(0) + H'(0) = -F(0) + F(0) = 0$$

$\Rightarrow G$  derivabilă în  $x_0 = 0$  și  $G'(0) = g(0) = 0$ . În concluzie,  $G$  e o primitivă pentru  $g$ , deci funcția  $g$  admite primitive.

### CLASA a XI-A

**P1. XI.** Fie  $A$  o matrice pătratică de ordin 3, cu toate elementele din mulțimea  $\{-1, 1\}$ .

a) Determinați toate valorile posibile ale determinantului matricei  $A$ .

b) Demonstrați că matricea  $A^n, n \in \mathbb{N}^*$ , are toate elementele nenule.

Demonstrație:

a) Dacă adunăm prima linie la liniile 2 și 3, pe aceste linii vor fi numai numere pare. Scoatem factor 2 de pe fiecare dintre ele și obținem că determinantul matricei  $A$ , care este număr întreg, se divide cu 4.

Însă  $\det A$  este sumă de șase termeni, fiecare egal cu 1 sau cu  $-1$ , prin urmare are valoarea cuprinsă între  $-6$  și  $6$ . Rezultă că  $\det A \in \{-4, 0, 4\}$  și se constată imediat că toate cele trei valori sunt posibile.

b) Se demonstrează ușor, prin inducție matematică, faptul că matricea  $A^n$  are toate elementele impare, oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}^*$ . În particular, toate elementele lui  $A^n$  vor fi nenule.

**P2. XI.** Fie  $A, B \in M_3(\mathbb{R})$  astfel încât  $A + B = I_3$  și  $A^2 = A^3$ . Să se arate că:

a)  $AB = BA$ ;

b)  $I_3 + AB$  este o matrice inversabilă.

Demonstrație:

a) Scrie  $B = I_3 - A$

Inmulteste la stanga si la dreapta relatia anterioara cu  $A$

Deduce  $AB = BA$

b) Inmulteste  $A + B = I_3$  la stanga cu  $A, A^2 + AB = A$  la dreapta cu  $A$  si obtine  $ABA = O_3$

Scrie  $(AB)^2 = (ABA)B$  de unde  $(AB)^2 = O_3$

Din  $I_3 = I_3 - (AB)^2$  deduce  $\det(I_3 - AB) \det(I_3 + AB) = 1$

Finalizeaza  $\det(I_3 + AB) \neq 0$

**P3. XI.** Se consideră șirurile de numere reale  $(a_n)_{n \geq 1}$ ,  $(b_n)_{n \geq 1}$  și  $(c_n)_{n \geq 1}$  definite prin:  $a_1 > 0$ ,  $b_1 > 0$ ,

$$a_{n+1} = a_n + 2b_n, \quad b_{n+1} = a_n + b_n, \quad c_n = \frac{a_n}{b_n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

a) Să se arate că  $|c_{n+1} - \sqrt{2}| = (\sqrt{2} - 1) \left| \frac{a_n - b_n \sqrt{2}}{a_n + b_n} \right|, \forall n \in \mathbb{N}^*.$

b) Să se calculeze  $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n.$

Demonstrație:

a)  $|c_{n+1} - \sqrt{2}| = \left| \frac{a_n + 2b_n - a_n \sqrt{2} - b_n \sqrt{2}}{a_n + b_n} \right| = (\sqrt{2} - 1) \left| \frac{a_n - b_n \sqrt{2}}{a_n + b_n} \right|$

b)  $|c_{n+1} - \sqrt{2}| = (\sqrt{2} - 1) \frac{c_n}{a_n + b_n} |c_n - \sqrt{2}| \leq \frac{1}{2} |c_n - \sqrt{2}|$

**P4. XI.** Fie  $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție crescătoare cu proprietatea că  $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(2x) - f(x)) = 0.$

Demonstrați că  $\forall a \in (0, +\infty)$ , există  $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(ax) - f(x))$  și valoarea acestei limite este 0.

Demonstrație:

$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(4x) - f(2x)) = 0 \quad (1p) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} (f(4x) - f(x)) = 0$

Prin inducție  $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(2^n x) - f(x)) = 0$  pentru  $x \rightarrow \frac{x}{2^n}$ ,

obținem  $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(\frac{x}{2^n}) - f(x)) = 0$

Fié  $k \in \mathbb{Z}$  a. p.  $2^k \leq a < 2^{k+1}$ ,  $f$  cresc  $\Rightarrow$

$$f(2^k x) - f(x) \leq f(ax) - f(x) \leq f(2^{k+1} x) - f(x)$$

Finalizare, cu  $x \rightarrow \infty$