

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ
ETAPA LOCALĂ 19.02.2015
Subiecte clasa a XI-a matematică-informatică

1. Fie matricele $A, B \in M_n(\mathbb{R})$.
 - a) Să se arate că dacă $AB = BA$ atunci $\det(A^2 + B^2) \geq 0$.
 - b) Dacă $\det A > 0$ să se arate că $\det(A - I_n + A^{-1}) \geq 0$.

2. Fie matricele $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ astfel încât $(A+B)^2 = A^2 + B^2$ și $(A+B)^4 = A^4 + B^4$.
 Să se arate că $(AB)^2 = O_n$.

(GM 10/ 2010)

3. Fie sirul $(a_n)_{n \geq 1}$ definit prin $a_1 > 0$ și $a_{n+1} = a_n + \ln(1+n+n^2)$, $\forall n \geq 1$.
 - a) Să se studieze convergența sirului $(a_n)_{n \geq 1}$.
 - b) Să se calculeze $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n \cdot \ln n}$.

(prof. Ruxanda și George Georgescu)

4. Fie sirul $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ cu termeni strict pozitivi, definit prin $a_1 = 1$ și

$$\sqrt{a_1} + \sqrt{a_2} + \dots + \sqrt{a_n} = \frac{n+1}{2} \sqrt{a_n}, \forall n \in \mathbb{N}^*$$
.
 - a) Să se arate că sirul are limită și să se calculeze $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.
 - b) Să se determine $p \in \mathbb{N}^*$ astfel încât $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n \cdot \ln \prod_{k=1}^p \cos \frac{k}{n} \right) = -7$.

(prof. Ruxanda și George Georgescu)

NOTĂ:

1. Toate subiectele sunt obligatorii.
2. Timpul de lucru este de trei ore.
3. Fiecare subiect se punctează cu 7 puncte.

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ ETAPA LOCALĂ 19.02.2015

barem clasa a XI-a matematică-informatică

1. a) $\det(A^2 + B^2) = \det(A+iB)(A-iB) = \dots$ 1p
 $= \det(A+iB) \cdot \det(\overline{A+iB}) = \dots$ 1p
 $= \det(A+iB) \cdot \overline{\det(A+iB)} = |\det(A+iB)|^2 \geq 0$ 1p

b) $\det(A^2 - A + I_n) = \det\left(\left(A - \frac{1}{2}I_n\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}I_n\right)^2\right) \geq 0$ 2p
 $\det(A^2 - A + I_n) = \det A(A - I_n + A^{-1}) = \det A \cdot \det A(A - I_n + A^{-1})$ 1p
 $\det A > 0 \Rightarrow \det(A - I_n + A^{-1}) \geq 0$ 1p

2. Din $(A+B)^2 = A^2 + B^2 \Rightarrow AB + BA = O_n$ 1p
Din $A(AB + BA)B = O_n \Rightarrow A^2B^2 + (AB)^2 = O_n$ 1p
Din $B(AB + BA)A = O_n \Rightarrow (BA)^2 + B^2A^2 = O_n$ 1p
Din $(A+B)^4 = A^4 + B^4$ și $(A+B)^4 = (A+B)^2(A+B)^2$ rezultă $A^2B^2 + B^2A^2 = O_n$ 1p
Se obține $(AB)^2 + (BA)^2 = O_n$ 1p
Din $AB + BA = O_n \Rightarrow AB = -BA$ 1p
Atunci $(AB)^2 + (-AB)^2 = O_n \Rightarrow (AB)^2 = O_n$ 1p

3. a) Din $a_{n+1} - a_n = \ln(1+n+n^2) \geq \ln 1 = 0$, $\forall n \geq 1$ rezultă că sirul $(a_n)_{n \geq 1}$ este crescător..... 1p
Dacă sirul ar fi mărginit, ar fi convergent cu $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \mathbb{R}$ și din relația de recurență ar rezulta $l = l + \infty$, absurd, deci sirul este divergent 1p
b) Din a) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ și din $b_n = n \cdot \ln n$ strict crescător și nemărginit 1p
se calculează $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+n+n^2)}{(n+1)\ln(n+1) - n\ln n} = \dots$ 1p
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+n+n^2)}{\ln\left(\frac{(n+1)^{n+1}}{n^n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+n+n^2)}{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n + \ln(n+1)} = \dots$ 1p

$$\begin{aligned}
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+n+n^2)}{\ln(n+1) \left(1 + \frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{\ln(n+1)} \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(n^2\left(\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n} + 1\right)\right)}{\ln\left(n\left(\frac{1}{n} + 1\right)\right)} = \dots \quad 1p \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\ln n + \ln\left(\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n} + 1\right)}{\ln n + \ln\left(\frac{1}{n} + 1\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n \left(2 + \frac{\ln\left(\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n} + 1\right)}{\ln n} \right)}{\ln n \left(1 + \frac{\ln\left(\frac{1}{n} + 1\right)}{\ln n} \right)} = 2 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n \cdot \ln n} = 2 \text{ conform}
\end{aligned}$$

lemei lui Stolz – Cesaro.....1p

4. a) Prin inducție matematică se arată că $a_n = n^2$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$ 2p

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \quad \dots \quad 1p$$

$$\begin{aligned}
b) l &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n^2 \left(\sum_{k=1}^p \ln\left(1 + \cos \frac{k}{n} - 1\right) \right) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^p \frac{\ln\left(1 - 2\sin^2 \frac{k}{2n}\right)}{-2\sin^2 \frac{k}{2n}} \cdot \frac{-2\sin^2 \frac{k}{2n}}{\left(\frac{k}{2n}\right)^2} \cdot \frac{k^2}{4n^2} \cdot n^2 = \dots \quad 2p
\end{aligned}$$

$$= -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^p k^2 = -\frac{p(p+1)(2p+1)}{12} \quad \dots \quad 1p$$

Se obține $p = 3$ 1p