



S.S.M.R - FILIALA MUREȘ

Olimpiada de matematică
Faza locală 13.02.2015
Clasa a VIII-a

I. THEMA

Wenn für die reelle Zahlen a und b die Beziehung $a^2 + b^2 - 2a\sqrt{2} - 2b\sqrt{3} + 5 = 0$ gültig ist, dann beweis, dass $\left(\frac{2}{a} + \frac{3}{b}\right) \cdot (b - a) = 1$

II. THEMA

Bestimmt die Maßen eines Quaders, wenn die Längen der Diagonalen der Flächen umgekehrt proportional mit $\frac{\sqrt{7}}{7}$, $\frac{\sqrt{11}}{11}$ und $\frac{\sqrt{6}}{6}$ sind und die Länge der Diagonale des Quaders $\sqrt{12}$ cm beträgt.

SuplimentGM nr.10/2013

III. THEMA

a) Zeigt, dass für jedwelche positive reelle Zahlen x, y gilt die Ungleichung

$$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$$

b) Zeigt, dass für jedwelche positive reelle Zahlen x, y, z gilt die Ungleichung

$$\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{z^2} + \frac{z^2}{x^2} \geq \frac{y}{x} + \frac{z}{y} + \frac{x}{z}$$

IV. THEMA

Es sei das Dreieck ABC rechtwinklig in A und der Punkt M, welche außerhalb der Ebene ABC liegt so, dass $MB \perp AB$ und $MC \perp AC$. Es seien die Punkte N, P und Edie Mittelpunkte der Strecken AM, BC bzw. AC. Prüft ob:

a) $PN \perp (ABC)$;

b) $4PN^2 = BM^2 - AC^2$.

Notă.

Toate problemele sunt obligatorii.

Fiecare problemă se notează de la 0 la 7 puncte.

Timpe de lucru 3 ore.

S.S.M.R - FILIALA MUREȘ

Olimpiada de matematică

Faza locală 13.02.2015

Clasa a VIII-a

Bareme de corectare

SUBIECTUL I. Dacă numerele reale $a^2 + b^2 - 2a\sqrt{2} - 2b\sqrt{3} + 5 = 0$, să se demonstreze că

$$\left(\frac{2}{a} + \frac{3}{b}\right) \cdot (b - a) = 1.$$

Rezolvare:

$$a^2 + b^2 - 2a\sqrt{2} - 2b\sqrt{3} + 5 = 0 \Leftrightarrow (a - \sqrt{2})^2 + (b - \sqrt{3})^2 = 0 \Rightarrow a = \sqrt{2}, b = \sqrt{3} \dots 4p$$

$$\left(\frac{2}{a} + \frac{3}{b}\right)(b - a) = \left(\frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{3}{\sqrt{3}}\right)(\sqrt{3} - \sqrt{2}) = 3 - 2 = 1 \dots \dots \dots 3p$$

SUBIECTUL II

Aflați dimensiunile unui paralelipiped dreptunghic, știind că lungimile diagonalelor fețelor lui sunt invers proporționale cu $\frac{\sqrt{7}}{7}$, $\frac{\sqrt{11}}{11}$ și $\frac{\sqrt{6}}{6}$, iar lungimea diagonalei lui este egală cu $\sqrt{12}$ cm.

Supliment GM nr.10/2013

Rezolvare:

$$d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \sqrt{12} \Rightarrow d^2 = a^2 + b^2 + c^2 = 12 \quad (1) \dots \dots \dots 1p$$

Diagonalele fețelor au lungimile: $\sqrt{a^2 + b^2}$, $\sqrt{a^2 + c^2}$, respectiv $\sqrt{b^2 + c^2} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \frac{\sqrt{7}}{7} = \sqrt{a^2 + c^2} \cdot \frac{\sqrt{11}}{11} = \sqrt{b^2 + c^2} \cdot \frac{\sqrt{6}}{6} = k$$

$$\Rightarrow \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{7}k, \sqrt{a^2 + c^2} = \sqrt{11}k, \sqrt{b^2 + c^2} = \sqrt{6}k \dots \dots \dots 2p$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 = 7k^2, a^2 + c^2 = 11k^2, b^2 + c^2 = 6k^2 \Rightarrow \text{adunând cele trei relații:}$$



$$2(a^2 + b^2 + c^2) = 24k^2 \Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 = 12k^2 \Rightarrow \text{înlocuind în (1)}$$

$$\Rightarrow k^2 = 1 \Rightarrow k = 1 \dots\dots\dots 2p$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 = 7 \Rightarrow c^2 = 5 \Rightarrow c = \sqrt{5} \text{ cm}$$

$$a^2 + c^2 = 11 \Rightarrow b^2 = 1 \Rightarrow b = 1 \text{ cm}$$

$$b^2 + c^2 = 6 \Rightarrow a^2 = 6 \Rightarrow a = \sqrt{6} \text{ cm} \dots\dots\dots 2p$$

SUBIECTUL III

a) Arătați că oricare ar fi x, y numerele reale pozitive are loc inegalitatea $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$

b) Arătați că oricare ar fi numerele reale pozitive x, y, z are loc inegalitatea:

$$\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{z^2} + \frac{z^2}{x^2} \geq \frac{y}{x} + \frac{z}{y} + \frac{x}{z}$$

Rezolvare:

a) $x + y \geq 2\sqrt{xy} \Rightarrow (\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geq 0 \dots\dots\dots 2p$

b) Notăm $a = \frac{x^2}{y^2}$, $b = \frac{y^2}{z^2}$ și $c = \frac{z^2}{x^2}$

Din inegalitatea mediilor avem: $a + b \geq 2\sqrt{ab}$; $b + c \geq 2\sqrt{bc}$, respectiv $a + c \geq 2\sqrt{ac}$...2p

Însumând relațiile de mai sus obținem $a + b + c \geq \sqrt{ab} + \sqrt{bc} + \sqrt{ac}$ 2p

Înlocuim în această inegalitate substituțiile inițiale obținem:

$$\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{z^2} + \frac{z^2}{x^2} \geq \frac{x}{y} \cdot \frac{y}{z} + \frac{y}{z} \cdot \frac{z}{x} + \frac{x}{y} \cdot \frac{z}{x} = \frac{x}{z} + \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \dots\dots\dots 1p$$

SUBIECTUL IV

Fie triunghiul ABC dreptunghic în A iar punctul M exterior planului ABC astfel încât $MB \perp AB$ și $MC \perp AC$. Fie N, P și E mijloacele segmentelor AM, BC respectiv AC . Stabiliți dacă :

a) $PN \perp (ABC)$;

b) $4PN^2 = BM^2 - AC^2$.

Rezolvare:

a) Segmentele BN și CN sunt mediane relative ipotenuzei $\Rightarrow BN = \frac{AM}{2} = CN$
 $\Rightarrow \triangle NBC$ isoscel de vârf N și cum $[NP]$ mediană $\Rightarrow NP \perp BC$ (1)1p

$\triangle MCA$: $[NE]$ linie mijlocie $\Rightarrow NE \parallel MC$ și cum $MC \perp AC$ obținem $NE \perp AC$ (2)1p

$\triangle ABC$: $[PE]$ linie mijlocie $\Rightarrow PE \parallel AB$ și cum $AB \perp AC$ obținem $PE \perp AC$ (3)1p

Din (2) și (3) obținem $AC \perp (NEP) \Rightarrow AC \perp NP$ (4)1p

Din (1) și (4) rezultă $NP \perp (ABC)$ 1p

b) $\triangle NPB \Rightarrow$ conform T.P

$$NP^2 = BN^2 - PB^2 = \frac{AM^2}{4} - \frac{BC^2}{4} \dots\dots\dots 1p$$

$$\Rightarrow 4NP^2 = AM^2 - (AC^2 + AB^2) \Rightarrow 4NP^2 = AM^2 - AB^2 - AC^2 \Rightarrow 4NP^2 = BM^2 - AC^2 \dots\dots 1p$$

Se punctează orice rezolvare corectă diferită de cea din barem